

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA RỄ CÂY HÀ THỦ Ô TRẮNG


Bùi Xuân Hào⁽¹⁾, Nguyễn Thị Hồng Yến⁽¹⁾, Nguyễn Minh Đức⁽²⁾, Trần Lê Quan⁽¹⁾

(1)Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

(2)Trường Đại học Y Dược Tp. HCM

(Bài nhận ngày 08 tháng 01 năm 2009, hoàn chỉnh sửa chữa ngày 24 tháng 08 năm 2009)

TÓM TẮT: Ba hợp chất khung cardenolid đã được cô lập từ rễ cây hà thủ ô trắng (*Streptocaulon juventas*). Cấu trúc các hợp chất này được làm sáng tỏ bằng các phương pháp phổ nghiệm. Trong số các hợp chất đã được cô lập, acovenosigenin A 3-O-glucosid là một dẫn xuất mới có khung cardenolid.



1. MỞ ĐẦU

Cây hà thủ ô trắng có tên khoa học là *Streptocaulon juventas* Merr., thuộc họ Asclepiadaceae. Trong y học cổ truyền, dịch trích nước rễ cây hà thủ ô trắng dùng giải độc, chữa cảm sốt, trị vết sưng đau, vết thương do rắn cắn ...[1, 2]. Các thử nghiệm về hoạt tính kháng ung thư cho thấy dịch chiết metanol rễ cây hà thủ ô trắng có độc tính chọn lọc đối với năm dòng tế bào ung thư là tế bào ung thư tử cung Hela người, tế bào ung thư phổi người A549, tế bào ung thư chuột colon 26-L5, tế bào ung thư phổi chuột LLC và tế bào ung thư ruột kết chuột B16-BL6 chuột [3].

Trong bài này, chúng tôi giới thiệu một vài kết quả nghiên cứu tách chiết và xác định cấu trúc hóa học của ba hợp chất được cô lập từ phần dịch nước còn lại của cao metanol rễ cây hà thủ ô trắng sau khi đã chiết cao metanol với CHCl_3 . Các hợp chất cô lập được là periplogenin glucosid, 17α -periplogenin, acovenosigenin A 3-O-glucosid. Trong số các chất đã được cô lập, acovenosigenin A 3-O-glucosid là một hợp chất mới, lần đầu tiên được tìm thấy trên thế giới.

2. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Từ phần dịch nước còn lại của cao metanol rễ cây hà thủ ô trắng sau khi đã chiết với CHCl_3 , bằng các phương pháp sắc ký cột silica gel, sắc ký cột silica gel RP-18, chúng tôi thu được ba hợp chất là periplogenin glucosid, 17α -periplogenin, acovenosigenin A 3-O-glucosid. Cấu trúc hóa học các hợp chất này được xác định bằng các phương pháp phổ nghiệm.

Periplogenin glucosid: Chất bột vô định hình không màu, tan trong metanol. Phổ $^1\text{H-NMR}$ của periplogenin glucosid cho thấy tín hiệu cộng hưởng của hai mũi đơn methyl ở δ 1,01 (3H, s, H-18); 1,07 (3H, s, H-19), proton carbinol ở δ 4,52 (1H, s, H-3); một nhóm oxymetylen -O-CH₂- ở δ 5,00; 5,29 (2H, dd, $J=18,5$ và $1,5$ Hz; H-21). Một proton olefin ở δ 6,12 (1H, br, s, H-22), một proton anomer ở δ 5,02 (1H, d, $J=8$, H-1'). Phổ $^{13}\text{C-NMR}$ DEPT 90 và DEPT 135 cho thấy các mũi cộng hưởng ứng với 29 carbon, trong đó có hai nhóm methyl, mười một nhóm metylen, mười nhóm metin; một vòng γ -lacton bất bão hòa có các tín hiệu của carbon olefin ở δ 117,7 (C-22); một carbon của nhóm carbonyl lacton ở δ 174,5 (C-23). Tín hiệu của một carbon tứ cấp oxygen hóa ở δ 84,7 (C-14) và tín hiệu carbon anomer của đơn vị đường ở δ 101,5 (C-1'). Phổ 2D NMR (COSY, HSQC và HMBC) giúp xác định chính xác vị trí cộng hưởng của toàn bộ các tín hiệu proton và carbon của periplogenin glucosid. Từ các số liệu phổ và so sánh với tài liệu tham khảo [4], khẳng định cấu trúc hợp chất cô lập được là periplogenin glucosid.

Tín hiệu cộng hưởng $^1\text{H-NMR}$, $^{13}\text{C-NMR}$ và tương quan HMBC của periplogenin glucosid được cho ở bảng 1.

Bảng 1. Số liệu phổ $^1\text{H-NMR}$ và $^{13}\text{C-NMR}$ và tương quan HMBC của periplogenin glucosid ($\text{C}_5\text{D}_5\text{N}$)

Vị trí C	δ 1H (ppm), J (Hz)	δ 13C (ppm)	Tương quan HMBC (H tương quan C)
1	1,36 m; 2,20 m	26,1	
2	1,95 m; 2,06 m	27,3	C-3; C-5
3	4,52 s	74,0	
4	1,58 m; 1,92m	36,3	C-10
5		73,2	
6	1,88 m; 2,06 m	33,2	
7	1,30 m; 2,24 m	24,6	
8	1,83 m	40,9	
9	1,63 m	39,2	
10		41,2	
11	1,26 m; 1,37 m	21,9	C-3
12	1,36 m; 1,42 m	39,9	C-9
13		50,0	C-8; C-14
14		84,7	
15	1,94 m; 2,08 m	33,9	

16	1,76 m; 1,92 m	26,7	
17	2,80 m	51,3	C-20, 21, 22
18	1,01 s	16,1	C-12, 13, 14, 17
19	1,07 s	17,2	C-1, 5, 9, 10
20		176,0	
21	5,00 m; 5,29 dd (1,5 Hz; 1,85 Hz)	73,3	C-20, 22
22		117,7	C-17, 20, 21, 23
23		174,5	
1'	5,02 m	101,5	C-3
2'	4,01 dd (8,5 Hz; 8,5 Hz)	75,2	C-3'
3'	4,24 dd (8,5 Hz; 8,5 Hz)	78,7	C-2', 4'
4'	4,20 dd (9,0 Hz; 9,0 Hz)	71,7	C-5', 6'
5'	3,97 ddd (2,5 Hz; 5,5 Hz; 8,5 Hz)	78,8	
6'	4,36 dd (5,5 Hz; 11,5 Hz) 4,55 dd (2,5 Hz; 11,5 Hz)	62,7	

Acovenosigenin A 3-O-glucosid: Chất bột vô định hình không màu, tan trong metanol. Khối phô ESI (+) cho mũi $[M+H]^+$ ở m/z 553,1 cho biết phân tử khối bằng 552 ứng với công thức phân tử $C_{29}H_{44}O_{10}$. Phô 1H -NMR của acovenosigenin A 3-O-glucosid cho thấy tín hiệu cộng hưởng của hai mũi đơn methyl ở δ_H 0,91 (3H, s, H-18); 1,11 (3H, s, H-19), hai proton carbinol ở δ_H 3,74 (1H, s, H-1) và 4,29 (1H, s, H-3); một nhóm oxymetylen -O-CH₂- ở δ_H 4,93 (1H, dd, $J=18,1.5$, H-21a) và 5,05 (1H, dd, $J=18,5;1,5$, H-21b) ở vùng trường thấp, một mũi ba ở δ_H 2,84 (1H, t, $J=6$, H-17). Một proton olefin ở δ_H 5,92 (1H, s, H-22), một proton anomeric ở δ_H 4,36 (1H, d, $J=8$, H-1'). Phô ^{13}C -NMR DEPT 90 và DEPT 135 cho thấy các mũi cộng hưởng ứng với 29 carbon, trong đó có hai nhóm methyl, mười nhóm metylen, mười hai nhóm metin, trong đó có hai nhóm metin carbinol ở δ_C 73,8 (C-1) và 76,2 (C-3); một vòng γ -lacton bất bão hòa có các tín hiệu của carbon olefin ở δ_C 117,8 (C-22); một carbon của nhóm carbonyl lacton ở δ_C 177,2 (C-23). Tín hiệu của một carbon tứ cấp oxygen hóa ở δ_C 86,3 (C-14) và tín hiệu carbon anomeric của đơn vị đường ở δ_C 102,2(C-1'). Phô 2D NMR (COSY, HSQC và HMBC) giúp xác định chính xác vị trí cộng hưởng của toàn bộ các tín hiệu proton và carbon của acovenosigenin A 3-O-glucosid. Tín hiệu cộng hưởng 1H -NMR và ^{13}C -NMR của acovenosigenin A 3-O-glucosid được cho ở bảng 2.

Bảng 2. Số liệu phô 1H -NMR và ^{13}C -NMR của acovenosigenin A 3-O-glucosid (MeOD).

Vị trí C	δ 1H (ppm), J (Hz)	δ ^{13}C (ppm)
1	3,74 s	73,8
2	2,10 m	32,5
3	4,29 s	76,2
4	1,88 m	30,1
5	2,04 s	31,8
6		27,2
7		22,4
8		42,8

9		38,5
10		40,8
11		22,1
12		41,1
13		50,9
14		86,3
15		33,3
16		28,1
17	2,84 t (6Hz)	52,1
18	0,91 s	16,4
19	1,11 s	19,2
20		178,4
21	4,93 dd (18,0 Hz; 1,5 Hz) ; 5,05 dd (18,5 Hz; 1,5 Hz)	75,4
22	5,92 s	117,8
23		177,2
1'	4,36 d (8,0 Hz)	102,2
2'	3,17 dd (9,0 Hz; 1,5 Hz)	75,1
3'	3,37 t (9 Hz)	78,1
4'		71,6
5'		78,1
6'	3,68 dd (12,0 Hz 5,5 Hz) ; 3,89 dd (12,0 Hz; 1,5 Hz)	62,7

Periplogenin: Tinh thể hình kim không màu (MeOH), tan trong metanol. Dựa vào kết quả phân tích phô ¹H-NMR, ¹³C-NMR, DEPT 90, DEPT 135 kết hợp với phô 2D NMR (HSQC và HMBC) đồng thời so sánh với tài liệu tham khảo [4], chúng tôi kết luận đã cô lập được một hợp chất từ cây hà thủ ô trắng là 17 α -periplogenin. Tín hiệu cộng hưởng ¹H-NMR và ¹³C-NMR của periplogenin được cho ở bảng 3.

Bảng 3. Số liệu phô ¹H-NMR và ¹³C-NMR của periplogenin (MeOD)

Vị trí C	δ ¹ H (ppm), J (Hz)	δ ¹³ C (ppm)
1		26,1
2		28,5
3	4,15 s	69,1
4		36,0
5		76,2
6		37,8
7		24,8
8		41,9
9		40,9
10		41,7
11		22,7
12		40,2

13		50,9
14		86,3
15		33,4
16		28,0
17	2,86 m	52,0
18	0,91 s	16,3
19	0,96 s	17,2
20		178,3
21	4,93 dd (18,5 Hz; 1,5 Hz) 5,05 dd (18,5 Hz; 1,5 Hz)	75,3
22	5,92 d (1,5 Hz)	117,8
23		177,2

3. THỰC NGHIỆM

3.1.Thiết bị và các điều kiện thí nghiệm

- Các mẫu chất tách được từ rễ cây hà thủ ô trắng được đo phổ cộng hưởng từ hạt nhân tại phòng NMR Viện Hóa học Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, trên máy Bruker Avance 500 [500 MHz (^1H) và 125 MHz (^{13}C)] với TMS là chất nội chuẩn, dung môi CD_3OD .

- Sắc ký bản mỏng được thực hiện trên bảng silica gel tráng sẵn (Merck, Kieselgel 60 F₂₅₄, 250 μm), bảng pha đảo RP₁₈ (Merck RP₁₈, 250 μm). Các cầu tử trên bản mỏng được phát hiện bằng đèn tử ngoại bước sóng 256 nm và bằng dung dịch H_2SO_4 20%, sấy nóng sau khi phun thuốc thử.

- Sắc ký cột được thực hiện trên silica gel pha thuận (40 – 63 μm , Merck) và silica gel pha đảo RP₁₈ (40 μm , Nacalai Tesque).

3.2.Thu hái và xử lý mẫu nguyên liệu, ly trích và cô lập các hợp chất:

Rễ cây hà thủ ô trắng được thu hái ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang vào tháng 10 năm 2007. Nguyên liệu được cắt nhỏ, sấy ở 60 °C và xay thành bột thô. Trích 8 kg bột thô rễ cây hà thủ ô với MeOH (đun hoàn lưu, 3 giờ \times 3 lần) lọc nóng và cô quay ở áp suất kém được 857 g cao thô MeOH. Trích cao MeOH với CHCl_3 bằng phương pháp chiết lỏng - lỏng được 190,6 g cao CHCl_3 . Thực hiện sắc ký cột Diaion HP-20 phần dịch nước còn lại sau khi chiết với CHCl_3 lần lượt bằng các dung môi 100% H_2O (ký hiệu H₁) ; H_2O -MeOH (tỷ lệ thể tích H_2O -MeOH 3:1, ký hiệu H₂); H_2O -MeOH 1:1 (ký hiệu H₃); H_2O -MeOH 1:3 (ký hiệu H₄) và MeOH 100% (ký hiệu H₅). Cô cạn các phân đoạn thu được từ cột Diaion được các cao tương ứng là H₁ (491,2 g), H₂ (29,8 g), H₃ (44,6 g), H₄ (29,6 g) và H₅ (4,3 g). Thực hiện sắc ký cột silica gel phân đoạn cao H₄ (28 g), hệ dung môi giải ly lần lượt là hỗn hợp CHCl_3 -MeOH- H_2O với các tỷ lệ lần lượt là 9:1:0,1; 8:2:0,2; 20:6:1; 14:6:1; và 6:4:1 kết hợp với sắc ký cột ngược pha (chất hấp phụ RP-18, hệ dung môi giải ly là hỗn hợp MeOH-MeCN- H_2O với các tỷ lệ là 1:1:4; 1:1:3; 1:1:2; 1:1:1; hỗn hợp MeCN- H_2O là 1:3; 1:2; 1:1), chúng tôi cô lập được các hợp chất periplogenin glucosid, 17 α -periplogenin, acovenosigenin A 3-O-glucosid

4. KẾT LUẬN

Trong nghiên cứu này, từ mẫu rễ cây hà thủ ô trắng được thu hái ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, chúng tôi đã khảo sát thành phần hóa học phần dịch nước còn lại của cao metanol rễ cây hà thủ ô trắng sau khi đã trích cao này với CHCl_3 . Bằng kỹ thuật sắc ký trên cột Diaion HP – 20, bàn mỏng, sắc ký cột trên silica gel pha thường, pha đảo RP-18 chúng tôi đã cô lập được ba hợp chất periplogenin glucosid, 17α -periplogenin, acovenosigenin A 3-O-glucosid. Cấu trúc các hợp chất này được xác định bằng các kết quả phô nghiệm như ^1H NMR, ^{13}C NMR, DEPT, HSQC và HMBC, LC – MS. Trong các hợp chất cô lập được, acovenosigenin A 3-O-glucosid là một hợp chất mới lần đầu tiên được cô lập trên thế giới.

CHEMICAL CONSTITUENTS FROM THE ROOTS OF *STREPTOCAULON JUVENTAS*

Bui Xuan Hao⁽¹⁾, Nguyen Thi Hong Yen⁽¹⁾, Nguyen Minh Duc⁽²⁾, Tran Le Quan⁽¹⁾

(1) University of Science, VNU-HCM

(2) The University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City

ABSTRACT: Three cardenolides were isolated from the root of *Streptocaulon juventas* Merr. Their structures were elucidated by their spectral data. A new cardenolide derivative named acovenosigenin A 3-O-glucosid from the metanol extract of the root of *Streptocaulon juventas* Merr.

Key words: cardenolides, *Streptocaulon juventas*.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1].Đỗ Tất Lợi, *Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam*, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 1039-1041, (1995).
- [2].Võ Văn Chi, *Từ điển Cây thuốc Việt Nam*, Nhà xuất bản Y học, Thành phố Hồ Chí Minh, 537-538 (1996).
- [3].Jun-ya Ueda, Yasuhiro Tezuka, Arjun H. Banskota, Quan Le Tran, Qui Kim Tran, Ikuo Saiki and Shigetoshi Kadota, *Antiproliferative Activity of Cardenolides Isolated from Streptocaulon juventas*, *Biol. Pharm. Bull.*, 26, 1431-1435, (2003)
- [4].Jun-ya Ueda, Yasuhiro Tezuka, Arjun H. Banskota, Quan Le Tran, Qui Kim Tran, Ikuo Saiki and Shigetoshi Kadota, *Constituents of Vietnamese Medicinal Plant Streptocaulon juventas and their Antiproliferative Activity*, *J. Nat. Prod.*, 66, 1427 -1433, (2003)